# 【食道-05】L 食道癌ドセタキセル

**（投与薬剤名・投与量・投与方法）**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| （Day1） | | | |
| 薬剤 1 | 生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 2 | ドセタキセル | 70mg/㎡ | 生食 250ml に混注し 1 時間で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | フラッシュ用 |

**（投与スケジュールの図式）**

| 使用薬剤 | Day1 | Day8 | Day15 | Day21 |
|---|---|---|---|---|
| ドセタキセル | ↓ | | | 休薬完了 |

# 【食道-07-1】 Nivolumab240(初回検査付)

**（投与薬剤名・投与量・投与方法）**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| （Day1） | | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | フラッシュ用でルート確保 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | 10 分で点滴（フラッシュ用） |

**（投与スケジュールの図式）**

| 使用薬剤 | Day1 | Day8 | **Day14** |
|---|---|---|---|
| オプジーボ | ↓ | | **休薬完了** |

# 【食道-07-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

**（投与薬剤名・投与量・投与方法）**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| （Day1） | | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | フラッシュ用でルート確保 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | 10 分で点滴（フラッシュ用） |

**（投与スケジュールの図式）**

| 使用薬剤 | Day1 | Day8 | **Day14** |
|---|---|---|---|
| オプジーボ | ↓ | | **休薬完了** |

# 【食道-08】L　Weekly パクリタキセル 6 投 1 休

**（投与薬剤名・投与量・投与方法）**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| （Day1、8、15、22、29、36） | | | |
| 薬剤 1 | レスタミンコーワ５錠 | | 点滴前に内服 |
| 薬剤 2 | 生食 100ml+ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A+ｶﾞｽﾀｰ 1A | | |
| | | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ | 100mg/㎡ | 生食 250ml に混注し、60 分で点滴（初回は 120 分） |
| 薬剤 4 | 生食 | 100ml | フラッシュ用 |

**（投与スケジュールの図式）**

| 使用薬剤 | Day1 | Day8 | Day15 | Day22 | Day29 | Day36 | Day43 | Day49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | 休薬完了 |

# 【食道-09-1】☆ FP+ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(検査付 1 回目)

**(投与薬剤名・投与量・投与方法)**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| (Day1) | | | |
| | ※側管投与の薬剤は 5-FU と同時投与 | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | ルート確保用 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 50ml | ルートフラッシュ用 |
| 薬剤 4 | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A | | |
| | | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 5 | ソルアセト F500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml | | |
| | | | 1時間で点滴 |
| | ※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服 | | |
| 薬剤 6 | 【側管】生食 500mL1 袋 | | 90 分で点滴 |
| 薬剤 7 | 【側管】ラシックス 20mg1A | | ワンショット静注 |
| 薬剤 8 | 【側管】ランダ | 70mg/㎡ | 生食 500ml(ーランダ量)に混注し2時間で点滴 |
| 薬剤 9 | 生食 1L1 袋＋ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 700mg/㎡ | | |
| | | | 24 時間持続点滴 |

(Day2-5)側管投与の生食は 5-FU と同時投与

| | | | |
|---|---|---|---|
| 薬剤 1 | 生食 1L1 袋＋5-FU700mg/㎡ | | 24 時間持続点滴 |
| 薬剤 2 | 【側管】生食 500mL1 袋 | | 120 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 【側管】生食 500mL1 袋 | | 120 分で点滴 |

(Day15)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | フラッシュ用でルート確保 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | 10 分で点滴(フラッシュ用) |

**(投与スケジュールの図式)**

| 使用薬剤 | Day1 | Day2～5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプジーボ | ↓ | | | ↓ | | **休薬完了** |
| ランダ | ↓ | | | | | **休薬完了** |
| ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ | ↓ | ↓ | | | | **休薬完了** |

# 【食道-09-2】☆ FP+ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(検査付 2 回目以降)

**(投与薬剤名・投与量・投与方法)**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| (Day1) | | | |
| | ※側管投与の薬剤は 5-FU と同時投与 | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | ルート確保用 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 50ml | ルートフラッシュ用 |
| 薬剤 4 | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A | | |
| | | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 5 | ソルアセト F500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml | | |
| | | | 1時間で点滴 |
| | ※薬剤 6 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服 | | |
| 薬剤 6 | 【側管】生食 500mL 1 袋 | | 90 分で点滴 |
| 薬剤 7 | 【側管】ラシックス 20mg1A | | ワンショット静注 |
| 薬剤 8 | 【側管】ランダ | 70mg/㎡ | 生食 500ml(ーランダ量)に混注し2時間で点滴 |
| 薬剤 9 | 生食 1L 1 袋＋ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 700mg/㎡ | | |
| | | | 24 時間持続点滴 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (Day2-5) | ※側管投与の生食は 5-FU と同時投与 | | |
| 薬剤1 | 生食 1L 1 袋＋5-FU700mg/㎡ | | 24 時間持続点滴 |
| 薬剤 2 | 【側管】生食 500mL 1 袋 | | 120 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 【側管】生食 500mL 1 袋 | | 120 分で点滴 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (Day15) | | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | フラッシュ用でルート確保 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | 10 分で点滴(フラッシュ用) |

**(投与スケジュールの図式)**

| 使用薬剤 | Day1 | Day2～5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプジーボ | ↓ | | | ↓ | | **休薬完了** |
| ランダ | ↓ | | | | | **休薬完了** |
| ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ | ↓ | ↓ | | | | **休薬完了** |

# 【食道-10】L 5-FU+ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ(2 回目以降検査付)

**(投与薬剤名・投与量・投与方法)**

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| (Day1) | | | |
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | ルート確保用 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 50ml | ルートフラッシュ用 |
| 薬剤 4 | 生食 100mL＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 5 | 生食 1L 1 袋＋ﾌﾙｵﾛﾗｼﾙ 700mg/㎡ | | |
| | | | 24 時間持続点滴 |

(Day2-5)

| | | |
|---|---|---|
| 薬剤 1 | 【側管】生食 100mL＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A | |
| | | 30 分で点滴 |
| 薬剤 2 | 生食 1L 1 袋＋ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 700mg/㎡ | |
| | | 24 時間持続点滴 |

(Day15)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 薬剤 1 | 生食 | 100ml | フラッシュ用でルート確保 |
| 薬剤 2 | オプジーボ | 240mg/**body** | 生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴 |
| 薬剤 3 | 生食 | 100ml | 10 分で点滴(フラッシュ用) |

**(投与スケジュールの図式)**

| 使用薬剤 | Day1 | Day2～5 | Day8 | Day15 | Day22 | Day28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプジーボ | ↓ | | | ↓ | | **休薬完了** |
| ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ | ↓ | ↓ | | | | **休薬完了** |