

【精巣-01】M BEP

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ソルデム 3 号	500ml	60 分で点滴
薬剤 2	グラニセロン点滴静注バッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ラシックス	20mg1A	側管よりワンショット
薬剤 4	ランダ	20mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 90 分で点滴
薬剤 5	エトポシド	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ソルアセト F	500ml	90 分で点滴

(Day2)			
薬剤 1	ソルデム 3 号	500ml	60 分で点滴
薬剤 2	グラニセロン点滴静注バッグ 3mg+デカトロン(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ブレオ	30mg/body	生食 50ml に混注し全開で投与
薬剤 4	ラシックス	20mg1A	側管よりワンショット
薬剤 5	ランダ	20mg/m ²	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 90 分で点滴
薬剤 6	エトポシド	100mg/m ²	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	ソルアセト F	500ml	90 分で点滴

(Day9,16)			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保
薬剤 2	ブレオ	30mg/body	生食 50ml に混注し全開で投与
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用(全開)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	...	Day9	...	Day16	...	Day21
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓						休薬完了
エトポシド	↓	↓	↓	↓	↓						休薬完了
ブレオ		↓					↓		↓		

【腎-01-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【腎-01-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【腎-01-3】 オプジーボ 480(4 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【腎-01-4】 オプジーボ 480(4 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	…	Day28
オプジーボ	↓		…	休薬完了

【腎-02-1】 Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【腎-02-2】 Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【腎-02-3】キイトルーダ(6 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【腎-02-4】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【前立腺-01】L 前立腺癌 ドセタキセル

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ドセタキセル	60mg/m ²	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了

【前立腺-02】L ジェブタナ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食 100ml+ホ°ラミン 5mg1A+カ°スター 20mg1A+デ°カ°ロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	生食	100ml	30 分で点滴
薬剤 3	ジェブタナ	20mg/m ²	生食 250ml に混注し 1 時間以上で点滴
※点滴速度: 125ml/hr で開始、10 分後にバイタルをチェックし問題がなければ 250ml/hr で継続			
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ジェブタナ	↓			休薬完了
プレドニゾロン 5mg	10mg/日を連日内服 (10mg を1回、もしくは 5mg を 2 回)			

【尿路上皮-01】☆GEM+CDDP(入院:ランダ day2)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤2	ゲムシタビン 1000mg/m ²		5%ブドウ糖 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤3	生食 100ml		全開(フラッシュ用)

(Day2)			
薬剤1	ソルデム3号 500ml+硫酸マグネシウム補正液 8ml		90 分で点滴
薬剤2	グラニセロン 3mg/100ml+デカドロン 3.3mg × 3A		15 分で点滴

※薬剤3(生食 500ml)開始時、アプレピタント 125mg内服 (ランダ開始 90 分前)

薬剤3	生食 500ml		90 分で点滴
薬剤4	ラシックス 0.5A		ランダ投与直前に側管からワンショット静注
薬剤5	ランダ 70mg/m ²		生食 500ml に混注し(全量 500ml)、2 時間で点滴
薬剤6	ラシックス 1A		ランダ投与直後に側管からワンショット静注
薬剤7	ソルアセトF 500ml		90 分で点滴
薬剤8	ソルデム3号 500ml		90 分で点滴
薬剤9	ソルアセトF 500ml		90 分で点滴

(Day3-4)			
生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 2A(15 分)→ソルデム3号 500ml(90 分)→ソルアセト F 500ml(90 分) →ソルデム3号 500ml(90 分)→ソルアセト F 500ml(90 分)			
※午前中にアプレピタント 80mg 内服			

(Day8,15)			
薬剤1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤2	ゲムシタビン 1000mg/m ²		5%ブドウ糖 100ml に混注し、30 分で点滴
薬剤3	生食 100ml		全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day2	Day8	Day15	Day21	Day28
ゲムシタビン	↓		↓	↓		休薬完了
ランダ		↓				休薬完了

【尿路上皮-01S】☆GEM＋CDDP(外来)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ 0.75mg＋デカドロン(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	アプレピタントカプセル 125mg1Cap		ランダ点滴 1 時間前に内服
薬剤 5	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 6	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 7	ランダ	70mg/m ²	生食 500ml(ーランダ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 8	生食	500ml	60 分で点滴

(Day2,3)

薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg	1 × 朝食後
------	------------------	---------

(Day8,15)

薬剤 1	生食 100ml＋デカドロン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ² 5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓				休薬完了

【尿路上皮-02】L GEM 単独(3 投 1 休)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1, 8, 15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカトロン(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了

【尿路上皮-04】M GEM＋CBDCA

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg＋デカトン(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(Day8)

薬剤 1	生食 100ml＋デカトン(3.3mg)1A	30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン 1000mg/m ²	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食 100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【尿路上皮-05】M PTX＋CBDCA

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	レスタミンコーワ錠5錠		パクリタキセル投与 30 分前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml＋デカトロン(3.3mg)4A＋ガスター1A		10 分で点滴
薬剤 3	パロセトロン点滴用バッグ	0.75mg	30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	175mg/m ²	生食 500ml に混注し 180 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【尿路上皮-06-1】Pembrolizumab(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【尿路上皮-06-2】Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg/body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
キイトルーダ	↓			休薬完了

【尿路上皮-06-3】キイトルーダ(6 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg/body	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【尿路上皮-06-4】キイトルーダ[®](6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ [®]	400mg/body	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	...	Day42
キイトルーダ [®]	↓				休薬完了

【尿路上皮-07-1】 Avelumab（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	カロナール 200mg × 3 錠、フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg × 1 錠		バベンチオ開始 30 分前に内服
薬剤 2	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 3	バベンチオ	10mg/kg	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
バベンチオ	↓		休薬完了

【尿路上皮-07-2】 Avelumab (2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	カロナール	200mg × 3 錠、フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg × 1 錠	バベンチオ開始 30 分前に内服
薬剤 2	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 3	バベンチオ	10mg/kg	生食 250ml に混注し、60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
バベンチオ	↓		休薬完了

【尿路上皮-08】L パドセブ

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1,8,15)			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン 3.3mg × 1A		30 分で点滴
薬剤 2	パドセブ	1.25mg/kg	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21	Day28
パドセブ	↓	↓	↓		休薬完了

【尿路上皮-09-1】 Nivolumab240(初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【尿路上皮-09-2】 Nivolumab240(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オブジーボ	240mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day14
オブジーボ	↓		休薬完了

【尿路上皮-09-3】 オプジーボ 480(4 週毎:初回検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了

【尿路上皮-09-4】 オプジーボ 480(4 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	480mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	...	Day28
オプジーボ	↓		...	休薬完了