【婦-03S】☆ 子宮頸癌 Weekly TP 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			15 分で点滴
	※薬剤2開始時にレスタミンコーワ５錠＋アプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	70 mg/㎡	生食 250mlに混合し 1 時間（初回のみ2時間）で点滴
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間で点滴

（Day8、15）	※点滴開始前にレスタミンコーワ５錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml ＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg) 3A ＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		
			30 分で点滴
薬剤 2	パクリタキセル	70 mg/㎡	生食 250mlに混合し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【婦-04】M 子宮頚癌　イリノテカン－ネダプラチン

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ソルデム 3 号	200ml	1 時間で点滴
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	アクプラ	80 mg/㎡	生食 500ml に混注し 2 時間で点滴
薬剤 5	ソルアセト F	500ml	2 時間で点滴
薬剤 6	ソルデム 3 号	500ml	2 時間で点滴

（Day8）			
薬剤 1	ソルデム 3 号	200ml	1 時間で点滴
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		30 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	ソルアセト F	500ml	2 時間で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
トポテシン	↓	↓		休薬完了
アクプラ	↓			休薬完了

【婦-05S】☆子宮体癌・卵巣癌　AP 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）	※点滴開始時にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg) 3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	ドキソルビシン	60 mg/㎡	生食 100mlに混合し全開投与
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス	20mg1A	側管からワンショット静注
薬剤 6	ランダ	50mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間点滴

c） 投与スケジュールの図式

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドキソルビシン	↓			**休薬完了**
ランダ	↓			**休薬完了**

【婦-06】L 軟部腫瘍 Gemcitabine/Docetaxel 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800 mg/㎡	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用
（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800mg/㎡	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	65mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ドキタキセル		↓		休薬完了

【婦−08】L 婦人科再発癌 Monthly ドセタキセル療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ソルデム 3 号	500ml	記載なし
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70 mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了

【婦-09】L　weekly PTX

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8、15）			
薬剤 1	レスタミンコーワ５錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間(初回のみ２時間)で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了

【婦-09A1】L　weekly PTX＋AVA（1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ５錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間(初回のみ2時間)で点滴
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8,15）			
薬剤 1	レスタミンコーワ５錠		点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-09A2】L weekly PTX＋AVA（2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1Ａ		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8,15）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1Ａ		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-09A3】L 再発卵巣癌 weekly PTX＋AVA（3 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8,15）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	点滴開始前に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-10】L 腹膜偽粘液腫 Biweekly　PTX＋S-1(100mg/日)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、15）			
薬剤 1	ソルデム3号	500ml	2 時間で点滴
	※点滴開始前にレスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 2	側管）生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		
			30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	120 mg/㎡	生食 250ml に混注し 2 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓		↓		休薬完了

【婦-12】M 卵巣癌　CPT-11＋PTX 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8、15）			
	※点滴開始前レスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		全開で点滴
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ	3mg1 袋	30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	60 mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間（初回のみ2時間）で点滴
薬剤 4	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
パクリタキセル	↓	↓	↓		休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		

【婦-13】M 婦人科癌　Monthly　TC

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ５錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		全開で点滴
薬剤 2	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 0.75mg　1 袋		30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	175 mg/㎡	生食 500ml に混注し 3 時間で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6	生食 250mlに混注し 1 時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【婦-14】M 卵巣癌 Weekly TC

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
	※点滴開始前にレスタミンコーワ５錠を内服		
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		
			全開で点滴
薬剤 2	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 0.75mg		
			30 分で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	80 mg/㎡	生食 250mlに混注し 1 時間（初回のみ２時間）で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC5	生食 250mlに混注し 1 時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8、15）

※点滴開始前にレスタミンコーワ５錠を内服

薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A＋ｶﾞｽﾀｰ 1A		
			30 分で点滴
薬剤 2	パクリタキセル	80 mg/㎡	生食 250mlに混注し 1 時間で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓	↓	↓	休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【婦-15】L 卵巣癌再発（ドキシル）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ＆ドキシル前後のフラッシュ用
薬剤 2	【側管】生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）2A		30 分で点滴
薬剤 3	【メイン】ドキシル	50 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
	※メインルートの5%ブドウ糖と差し替え		
薬剤 4	【メイン】5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	100ml	ルートキープ用を使用してフラッシュ

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドキシル	↓				休薬完了

【婦−15A1】L 卵巣癌再発ドキシル＋AVA（1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ＆ドキシル前後のフラッシュ用
薬剤 2	【側管】生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）2A		30 分で点滴
薬剤 3	【メイン】ドキシル	50 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	【メイン】5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	100ml	ルートキープ用を使用してフラッシュ
薬剤 5	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドキシル	↓				休薬完了
アバスチン	↓				休薬完了

【婦−15A2】L 卵巣癌再発ドキシル＋AVA（2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ＆ドキシル前後のフラッシュ用
薬剤 2	【側管】生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）2A		30 分で点滴
薬剤 3	【メイン】ドキシル	50 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	【メイン】5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	100ml	ルートキープ用を使用してフラッシュ
薬剤 5	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドキシル	↓				休薬完了
アバスチン	↓				休薬完了

【婦−15A3】L 卵巣癌再発ドキシル＋AVA（3 回目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ＆ドキシル前後のフラッシュ用
薬剤 2	【側管】生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）2A		30 分で点滴
薬剤 3	【メイン】ドキシル	50 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	【メイン】5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	100ml	ルートキープ用を使用してフラッシュ
薬剤 5	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドキシル	↓				休薬完了
アバスチン	↓				休薬完了

【婦-16】M 子宮頸癌 DC 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		全開で点滴
薬剤 2	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ	0.75mg 1 袋	30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	60 mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC6.0	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 5	生食	100ml	10 分（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了

【婦-17S】☆卵巣癌　CPT-P 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg) 3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500mlに混合し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	ラシックス 20mg	1A	側管からワンショット静注
薬剤 5	ランダ	60 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間点滴
薬剤 6	生食	500ml	1 時間点滴
（Day8、15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×2A		
			30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500mlに混合し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ランダ	↓				**休薬完了**
トポテシン	↓	↓	↓		**休薬完了**

【婦-17】☆卵巣癌　CPT-P 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ソルデム3号 500ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		1 時間で点滴
	※薬剤2開始前にアプレピタントカプセル 125mg		
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝバッグ	1袋	10 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500mlに混合し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 4	ランダ	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し（-ランダ量）2 時間で点滴
薬剤 5	ソルデム 3 号 500ml＋ラシックス 0.5A		2 時間で点滴
薬剤 6	ソルデム 3 号	500ml	2 時間で点滴
薬剤 7	ソルデム 3 号	500ml	2 時間で点滴
薬剤 8	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴
薬剤 9	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴

（Day2、3）
※ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄカプセル 80mg を午前中、デカドロン錠（0.5）1 回 8 錠を 1 日 2 回朝夕食後に内服

薬剤 1	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴
薬剤 3	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴

（Day4、5）　※デカドロン錠（0.5）1 回 8 錠を 1 日 2 回朝夕食後に内服（5 日目はオプション）

薬剤 1	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号	500ml	1 時間で点滴

（Day8、15）

薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）3A		30 分で点滴
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝバッグ	1袋	10 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500mlに混合し 2 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	10 分（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ランダ	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-18】M PLDC 療法（ドキシルカルボ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ＆ドキシル前後のフラッシュ用
薬剤 2	【側管】生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ（3.3mg）3A		30 分で点滴
薬剤 3	【側管】ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 0.75mg1 袋		
			30 分で点滴
薬剤 4	【メイン】ドキシル	30 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 5	【メイン】5%ブドウ糖	100ml	ルートキープ用を使用してフラッシュ
薬剤 6	【メイン】カルボプラチン	AUC＝5.0	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	【メイン】生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ドキシル	↓				休薬完了
カルボプラチン	↓				

【婦-19】M 再発卵巣癌 GC 療法（ジェムカルボ）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルートキープ用
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		全　開
薬剤 3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ 0.75mg1 袋		30 分で点滴
薬剤 4	カルボプラチン	AUC＝4.0	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 5	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	フラッシュ用

（Day8）			
薬剤 1	生食	100ml	ルートキープ用
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 4	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	5%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
カルボプラチン	↓			

【婦-20】L 再発卵巣癌 GEM（3投1休）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8、15）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1Ａ		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-21】M　軟部腫瘍 ADM 単独療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8、15）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		全開
薬剤 2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg	1 袋	30 分で点滴
薬剤 3	ドキソルビシン	70mg/㎡	生食 100ml に混注し全開で投与
薬剤 4	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドキソルビシン	↓			休薬完了

【婦-22S】☆ 卵巣癌　CP 療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg) 3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
	※薬剤 3 開始時にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 3	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 4	ラシックス 20mg	１A	側管からワンショット静注
薬剤 5	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml に混注し（全量 500ml）1 時間で点滴
薬剤 6	生食	100ml	10 分で点滴
薬剤 7	エンドキサン	800 mg/㎡	生食 250mlに混合し 1 時間で投与
薬剤 8	生食	500ml	1 時間点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ランダ	↓			休薬完了
エンドキサン	↓			休薬完了

【婦-23S】☆CDDP 単独毎週投与　RT 併用

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			60 分で点滴
	※薬剤 3 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 3	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 4	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 5	ランダ	40 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	生食	500ml	60 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day7
ランダ	↓	休薬完了

【婦-24-1】M 婦人科癌 Monthly TC＋AVA（1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 30 分以上前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		10 分で点滴
薬剤 3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg1 袋		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	175mg/㎡	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-24-2】M 婦人科癌 Monthly TC＋AVA（2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 30 分以上前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		10 分で点滴
薬剤 3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg1 袋		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	175mg/㎡	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-24-3】M 婦人科癌 Monthly TC＋AVA（3 回目以降）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	レスタミンコーワ	５錠	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与 30 分以上前に内服終了
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		10 分で点滴
薬剤 3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg1 袋		30 分で点滴
薬剤 4	パクリタキセル	175mg/㎡	生食 500ml に混注し3時間で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC6	生食 250ml に混注し1時間で点滴
薬剤 6	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
カルボプラチン	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-25】AVA 単剤継続投与

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アバスチン	5mg/kg	初回：90 分、2 回目:60 分、3 回以降：30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-26】L GEM（２投１休）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了

【婦-26A1】L GEM＋AVA（1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）
（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-26A2】L GEM＋AVA（2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し1時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-26A3】L GEM＋AVA（3 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000mg/㎡	ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-27】M　CPT-11（100）　3 投1休

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1,8,15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-27A1】M　CPT-11+AVA(1 回目)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8,15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アバスチン	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-27A2】M　CPT-11+AVA(2 回目)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）
（Day8,15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アバスチン	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-27A3】M　CPT-11+AVA(3 回目以降)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	全開（フラッシュ用）
（Day8,15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
アバスチン	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【婦-28S】☆　DP 療法(ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ＋ﾗﾝﾀﾞ)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg) 3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70 mg/㎡	生食 250mlに混合し 1 時間で点滴
	※薬剤 4 開始時にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	60mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間点滴

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ドセタキセル	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【婦−29A1】L ハイカムチン+AVA(1 回目)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（Day2、3、4、5）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	・・・	Day21
ハイカムチン	↓	↓	↓	↓	↓			休薬完了
アバスチン	↓							休薬完了

【婦−29A2】L ハイカムチン+AVA(2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（Day2、3、4、5）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	・・・	Day21
ハイカムチン	↓	↓	↓	↓	↓			休薬完了
アバスチン	↓							休薬完了

【婦−29A3】L ハイカムチン+AVA(3 回目以降)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（Day2、3、4、5）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×１A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1.25mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	・・・	Day21
ハイカムチン	↓	↓	↓	↓	↓			休薬完了
アバスチン	↓							休薬完了

【婦−30AS1】☆　Monthly TP+AVA(1 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		15 分で点滴
	※薬剤2開始時にアプレピタントカプセル 125mg＋レスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		1 時間で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	175 mg/㎡	生食 500ml に混合し 3 時間で点滴
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	50 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 8	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 1 時間 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦−30AS2】☆　Monthly TP+AVA(2 回目）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			15 分で点滴
	※薬剤2開始時にアプレピタントカプセル 125mg＋レスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	175 mg/㎡	生食 500ml に混合し 3 時間で点滴
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	50 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 8	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦−30AS3】☆　Monthly TP+AVA(3 回目以降)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)4A＋ｶﾞｽﾀｰ1A		
			15 分で点滴
	※薬剤2開始時にアプレピタントカプセル 125mg＋レスタミンコーワ5錠を内服		
薬剤 2	ソルデム 3 輸液 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		
			1 時間で点滴
薬剤 3	パクリタキセル	175 mg/㎡	生食 500ml に混合し 3 時間で点滴
薬剤 4	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	50 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 1 時間で点滴
薬剤 7	生食	500ml	1 時間で点滴
薬剤 8	アバスチン	15mg/kg	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 9	生食	100ml	フラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
パクリタキセル	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了
アバスチン	↓			休薬完了

【婦-31-1】 Pembrolizumab(初回検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	**投与量**	**投与方法**
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / **body**	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	**Day21**
キイトルーダ	↓			**休薬完了**

【婦-31-2】 Pembrolizumab(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	200mg / **body**	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	**Day21**
キイトルーダ	↓			**休薬完了**

【婦-31-3】キイトルーダ(6 週毎：初回検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / **body**	生食 50ml に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	…	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了

【婦-31-4】キイトルーダ(6 週毎:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	キイトルーダ	400mg / **body**	生食 50ml に溶解し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	…	Day42
キイトルーダ	↓				休薬完了