【軟部-01】M GEM＋DOC 併用療法

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800 mg/㎡	５%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	ドセタキセル	70mg/㎡	生食 250ml に混注し 1 時間で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用
（Day8）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	800mg/㎡	５%ブドウ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ゲムシタビン	↓	↓		休薬完了
ドセタキセル	↓			休薬完了

【軟部-02】L ハラヴェン

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1,8）			
薬剤 1	生食 100ml+デカドロン(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	ハラヴェン	1.4mg/㎡	生食 50ml に混注し5分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ハラヴェン	↓	↓		休薬完了