【肺小-01S】☆ CDDP＋CPT-11

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 125mg 1Cap		制吐剤開始前に内服
薬剤 2	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 3	ソルデム 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 4	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	60 mg/㎡	生食に混注(計 500ml)60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

（Day8、15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	60 mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ランダ	↓				休薬完了
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-02】M CBDCA＋CPT-11

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC=5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	トポテシン	50 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day8）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	50 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
カルボプラチン	↓			休薬完了
トポテシン	↓	↓		休薬完了

【肺小-03S】☆ CDDP＋VP-16

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 075mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		15 分で点滴
薬剤 2	ソルデム 3 号＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	アプレピタントカプセル 125mg 1Cap		薬剤 4(生食 500ml)点滴開始時に内服
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 5	ランダ	80 mg/㎡	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	フラッシュ用

（Day2、3）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 2	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap		午前中に内服
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	12 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-04】M CBDCA＋VP-16

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ	0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A	30 分で点滴
薬剤 2	カルボプラチン	AUC=6	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day2、3）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	・・・・・・	Day21
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-05】M CPT-11

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、8、15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋	＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A	30 分で点滴
薬剤 2	トポテシン	100mg/㎡	生食 500ml に混注し 90 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
トポテシン	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-06】M AMR（カルセド）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、2、3）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	カルセド	45 mg/㎡	生食 50ml に混注し、全開で 10 分以内
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
カルセド	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-07】M NGT（ハイカムチン）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1、2、3、4、5）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×1A		30 分で点滴
薬剤 2	ハイカムチン	1mg/㎡	生食 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	・・・	Day21
ハイカムチン	↓	↓	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-09-1】M CBDCA＋VP-16＋ﾃｾﾝﾄﾘｸ(初回検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day2, 3）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	・・・・・・	Day21
テセントリク	↓				休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-09-2】M CBDCA＋VP-16＋ﾃｾﾝﾄﾘｸ(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（Day2, 3）

薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	・・・・・・	Day21
テセントリク	↓				休薬完了
カルボプラチン	↓				休薬完了
ラステット	↓	↓	↓		休薬完了

【肺小-10】テセントリク(2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	テセントリク	1200mg/body	生食 250ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	全開(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
テセントリク	↓			休薬完了

【肺小-11S1】☆ CDDP＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 075mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	アプレピタントカプセル 125mg 1Cap		薬剤 7(生食 500ml)点滴開始時に内服
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 10	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 11	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2、3）			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap		午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-11S2】☆ CDDP＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 075mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 5	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	アプレピタントカプセル 125mg 1Cap		薬剤 7(生食 100ml)点滴開始時に内服
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 8	ラシックス 20mg 1A		ワンショット静注
薬剤 9	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 10	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 11	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2、3）			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap		午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-12S1】☆ CDDP＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（≦30kg：検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 075mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
	※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 5	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	10 分で点滴
薬剤 7	ラシックス 20mg 1A		ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 9	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2、3）			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg	1Cap	午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-12S2】☆ CDDP＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（≦30kg：検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 075mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
	※薬剤 5 開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 5	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 6	生食	100ml	10 分で点滴
薬剤 7	ラシックス 20mg 1A		ワンショット静注
薬剤 8	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml に混注(計 500ml)とし 60 分で点滴
薬剤 9	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 10	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2、3）			
薬剤 1	アプレピタントカプセル 80mg 1Cap		午前中に内服
薬剤 2	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)2A		30 分で点滴
薬剤 3	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 4	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
ランダ	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-13-1】M CBDCA＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（初回検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2, 3）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-13-2】M CBDCA＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg/body	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴(フラッシュ用)
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2, 3）			
薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-14-1】M CBDCA＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（≦30kg：検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2, 3）

薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-14-2】M CBDCA＋VP-16＋ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ（≦30kg：検査付）

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	ルート確保用(ルート確保後、廃棄)
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	50ml	10 分で点滴（フラッシュ用）
薬剤 4	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			30 分で点滴
薬剤 5	カルボプラチン	AUC 5	生食 250ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 6	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（Day2, 3）

薬剤 1	生食 100ml＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 3.3mg×２A		30 分で点滴
薬剤 2	ラステット	100 mg/㎡	生食 500ml に混注し 60 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day2	Day3	Day4	・・・	Day21
イミフィンジ	↓					休薬完了
カルボプラチン	↓					休薬完了
ラステット	↓	↓	↓			休薬完了

【肺小-15】 イミフィンジ(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	1500mg	生食 250ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了

【肺小-16】 イミフィンジ(≦30kg:2 回目以降検査付)

(投与薬剤名・投与量・投与方法)

	薬剤名	投与量	投与方法
(Day1)	※輸液セットはシュアプラグ輸液セットを使用		
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	イミフィンジ	20mg/kg	生食 100ml に混注し、60 分かけて点滴
薬剤 3	生食	100ml	(フラッシュ用)

(投与スケジュールの図式)

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
イミフィンジ	↓				休薬完了