【中皮腫-01S】☆ CDDP＋PEM

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	ペメトレキセド	500 mg/㎡	生食 100ml に混注し 10 分で点滴
	※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	75 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day21
ペメトレキセド	↓			休薬完了
ランダ	↓			休薬完了

【中皮腫-02S】☆ CDDP＋GEM

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)3A		
			15 分で点滴
薬剤 2	ｿﾙﾃﾞﾑ 3 号 500ml＋硫酸 Mg 補正液 8ml		60 分で点滴
薬剤 3	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
	※薬剤4開始前にアプレピタントカプセル 125mg を内服		
薬剤 4	生食	500ml	60 分で点滴
薬剤 5	ラシックス 20mg	1A	ワンショット静注
薬剤 6	ランダ	80 mg/㎡	生食 500ml(ーﾗﾝﾀﾞ量)に混注し 60 分で点滴
薬剤 7	生食	500ml	60 分で点滴

（Day8、15）			
薬剤 1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ 3mg1 袋＋ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(3.3mg)1A		
			30 分で点滴
薬剤 2	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 100ml に混注し 30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	ルートフラッシュ用

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
ゲムシタビン	↓	↓	↓		休薬完了
ランダ	↓				休薬完了

【中皮腫-03-1】 オプジーボ＋ヤーボイ(初回検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はﾔｰﾎﾞｲと同速度、その後は全開
（Day22）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	…	Day22	Day29	…	Day42
オプジーボ	↓		…	↓		…	休薬完了
ヤーボイ	↓		…			…	休薬完了

【中皮腫-03-2】 オプジーボ＋ヤーボイ(2 回目以降検査付)

（投与薬剤名・投与量・投与方法）

	薬剤名	投与量	投与方法
（Day1）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	30 分でフラッシュ
薬剤 4	ヤーボイ	1mg/kg	生食 100ml(全量 25ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 5	生食	100ml	20 分間はﾔｰﾎﾞｲと同速度、その後は全開

（Day22）			
薬剤 1	生食	100ml	フラッシュ用でルート確保
薬剤 2	オプジーボ	360mg/body	生食 100ml(全量 100ml に調製)に混注し、30 分で点滴
薬剤 3	生食	100ml	10 分で点滴（フラッシュ用）

（投与スケジュールの図式）

使用薬剤	Day1	Day8	…	Day22	Day29	…	Day42
オプジーボ	↓		…	↓		…	休薬完了
ヤーボイ	↓		…			…	休薬完了